

表面处理技术概论



[表面处理技术概论_下载链接1](#)

著者:刘光明 编

[表面处理技术概论_下载链接1](#)

标签

评论

还可以，蛮专业的一本书。

送书快，不误事

各种表面处理技术都有涉及，介绍的还是十分全面的

不错！值得购买！不错！值得购买！

顶呱呱不错啊

不错的书籍~~~~~

很好，送货也很快，头天晚上下单，第二天上午就收到货了，我很满意

内容很有用。看了之后对基本概念有了一定理解。

给同事买的，看起来还好

非常的好，工作的需要，又送货上门，折扣后还可以满200减40哟，快来抢吖~

写的蛮不错的

书角有点拆痕

表面处理技术概论 挺好的

专业书籍，应用方面没怎么涉及，不适合我这样的需要应用性强一点的

我讨厌京东客服。那客服电话从没人接

专业书，适合工作中使用

专业书籍，内容没的说！

很好很好很好很好很好很好很好

讲的还是比较系统的一本书；

东西很好哦!

不错的专业书籍，对工作也有帮助

还不错，内容是高教版的，不是很详细

还可以

质量好

书是没得说，速度也快，但是包装太差了，没有任何保护材料，其中一本书表面已经破损（运输磕伤）

教科书，不适合科普类的。太专业化的东西，对于我这个外行来说，太高深了，我买这本书的原因，就是为了科普，因为工作中经常接触到这类表面处理。

？

一般般吧

好

lllllllllllllljjjjkkk

《160种园林绿化苗木繁育技术》介绍了当前国内常见的160种园林苗木的繁育技术。内容包括常绿针叶树类、落叶针叶树类、常绿阔叶类、落叶阔叶类、常绿灌木类、落叶灌木类、绿篱类、藤木类、观赏竹类、垂枝类等。在内容安排上力求体现先进性、应用性、实践性和创新性，注重实效，培养能力，突出和强调其指导性、可操作性和易自学性。《160种园林绿化苗木繁育技术》可供园林园艺行业中的生产技术人员，苗圃场、育苗专业户及园林工程相关专业的师生参考阅读。 4.常规栽培管理
二乔玉兰为肉质根，根系损伤后，愈合期较长，故移植时应尽量多带土球。最宜在酸性、富含腐殖质而排水良好的地域生长，微碱土也可。不耐积水，低洼地与地下水位高的地区都不宜种植，根际积水易落叶，或根部窒息致死。管理过程中苗期应防立枯病、黄化病、根腐病及蛴螬等地下害虫，还要防治炭疽病，此外茎干有天牛为害，盛夏时要防红蜘蛛。二、天目木兰（Magnolia amoena Cheng） 1.树种简介
木兰科木兰属。高8~15m;树皮灰色至灰白色，光滑；小枝带紫色。叶互生，厚纸质，阔倒披针状长圆形或长圆形，先端长渐尖或短尾尖，基部宽楔形或近圆形，全缘。花先

叶开放，单生枝顶呈杯状，具芳香；花丝紫红色，离生心皮多数。聚合蓇葖果圆筒形，通常少数，木质，先端圆或钝，表面密布瘤状点；种子黑色，光滑，扁平。3月上旬开花，果实9月下旬成熟。天目木兰是耐阴树种，性耐寒而不耐干热，生长中等，在肥沃湿润而排水良好的酸性土长势较好，生于低湿积水地，常易烂根。中国特有种，分布于浙江、安徽、江西、江苏，生于海拔200~1000m低山丘陵的常绿和落叶阔混交林内。

国家三级保护渐危种。2.繁殖方法

播种繁殖。天目木兰在聚合果成熟种子尚未脱落前进行采种。采回的果实晾干后取出种子，洗去种皮进行混沙贮藏春播或随采随播（秋播）。秋播一般在种子处理后10d内播种，最迟也要在土壤封冻前15d进行。秋播的圃地以沙性土较少为好，但不能过于黏重。播种前每亩施入40kg的复合肥，翻地耙平整细，作南北向苗床。点播采用行宽30cm，种间距宽25cm，播种沟深5cm，覆土2cm，稍加镇压，用喷壶浇一次透水，盖上遮阳网，并用树枝或石头将遮阳网固定于床中，防止风、鼠、鸟等危害。若冬季干旱多风，土壤干燥可适当喷水保湿，以利于早春种子发芽整齐。春播经沙藏的天目木兰种子在3月1日前后用筛子筛出种子，立即用0.5%的高锰酸钾溶液浸泡30min后清洗，清洗时水选多次，去除霉变种子和飘浮的种子之后进行保温催芽，条播，行距20cm，沟深8cm，先在沟底施入充分腐熟的有机肥，后放5cm的黄土覆盖基肥，然后播种，播后在种子上覆盖细黄土，并喷洒水保湿，最后盖遮阳网或铺1层稻草，用种量为8~10kg/亩。

3.整形修剪

天目木兰树形为自然式合轴主干形。秋末冬初整枝修剪，将上年生长的枝在其基部留芽剪截，应注意剪口芽须向外侧，剪口紧邻剪口芽上方。先确定主干以及每轮保留几个主枝，第二个主枝应当与第一主枝有一定间隔，且要错落分布。避免产生交叉枝、重叠枝并要保持树姿的平衡。有时为了保持树形的紧凑，需对枝条作回缩修剪。

4.常规栽培管理

移植时间以萌动前，或花刚谢、展叶前为好。移栽时无论苗木大小，均需带宿土。大苗栽植要带土球。也6月上旬雨季开始后带土球移栽，栽后浇足定根水，培土要高于地表，防止积水烂根和土壤板结，利于幼树成活生长。天目木兰幼苗易发生立枯病，发病初期每亩用70%敌克松500倍液（每亩用100kg药液），喷淋或浇泼苗床2~3次，每次间隔时间10~15d。……

[表面处理技术概论_下载链接1](#)

书评

[表面处理技术概论_下载链接1](#)