


当归芍药散



[当归芍药散_下载链接1](#)

著者:王建辉，张硕 著

[当归芍药散_下载链接1](#)

标签

评论

经典名方，中医经验，值得学习

我买的是药！给我的是一本书！

评价大于20元的商品超过10个字就有机会获得京豆！

东西不错，继续支持京东！

慢慢能看懂了，开本印刷都可以，准备买一套的。

图书收到了，物流配送很快，京东购物方便快捷，值得信赖

一如既往的快又好....老顾客了支持京东...

可以当作拓展思路、开阔视野的读物！

包装很好、印刷精良、是正版。

好书啊好书 很有参考价值的

可以学到方剂的拓展应用！起到举一反三，灵活应用的效果！值得推荐！

好书好书好好好好

研究一下中医

书看着是正品，就是发货太慢了。

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

当归芍药散

感觉是一本不错的书，还没有看哦。

书的质量不错，看着很舒服

好评

不错

好

当归芍药散张仲景，医学家。名机，字仲景。南阳郡涅阳（河南南阳）人。所著《伤寒杂病论》被改编成《伤寒论》、《金匱玉函经》、《金匱要略》三书。作者主要作品
伤寒论 金匱要略 全本黄帝内经（大全集）（珍藏本）（超值白金版）
中华经典藏书：黄帝内经 中华经典名著全本全注全译丛书：黄帝内经（套装全2册）
伤寒论白话图解 注解伤寒论 伤寒论译释（第4版） 目录 伤寒论 卷第一 辨脉法第一
一脉法第二 伤寒论 卷第二 伤寒例第三 辨痞湿喝病脉证第四 辨太阳病脉证并治上第五

(1-30) 桂枝汤 桂枝加葛根汤 桂枝加附子汤 桂枝去芍药汤 桂枝去芍药加附子汤
桂枝麻黄各半汤 桂枝二麻黄一汤 白虎加人参汤 桂枝二越婢一汤 桂枝去桂加茯苓白术汤
甘草干姜汤 芍药甘草汤 调胃承气汤 四逆汤 伤寒论 卷第三
辨太阳病脉证并治中第六 (31-127) 葛根汤 葛根加半夏汤 葛根黄芩黄连汤 麻黄汤
小柴胡汤 小青龙汤 小青龙汤 桂枝汤 桂枝加厚朴杏子汤 干姜附子汤
桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤 麻黄杏仁甘草石膏汤 桂枝甘草汤
茯苓桂枝甘草大枣汤 厚朴生姜半夏甘草人参汤 茯苓桂枝白术甘草汤 芍药甘草附子汤
茯苓四逆汤 调胃承气汤 五苓散…… 作寒论 卷第四 作寒论 卷第五 作寒论 卷第六
作寒论 卷第七 作寒论 卷第八 作寒论 卷第九 作寒论 卷第十 伤寒论后序
附《伤寒论》子目 后记 方剂索引 收起全部 精彩书摘
伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。方十二。桂枝去皮 黄芩一两 半人参一两半 甘草一两，炙 半夏二合半，洗 芍药一两半 大枣六枚，擘 生姜一两半，切 柴胡四两
上九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，本云人参汤，作如桂枝法，加半夏、柴胡、黄芩，复如柴胡法，今用人参作半剂。
伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。方十三。柴胡半斤
桂枝三两，去皮 干姜二两 栝楼根四两 黄芩三两 牡蛎二两，熬 甘草二两，炙
上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服，初服微烦，复服汗出便愈。
伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉细者，此为阳微结，必有表，复有里也，脉沉亦在里也。汗出为阳微，假令纯阴结，不得复有外证，悉人在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病。所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。设不了了者，得屎而解。十四。用前第十方。
伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而鞭痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。方十五。
半夏半升，洗 黄芩 干姜 人参 甘草炙，各三两 黄连一两 大枣十二枚，擘
上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。须大陷胸汤者，方用前第二法。一方用半夏一升
太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下鞭，下利不止，水浆不下，其人心烦。脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳。
太阳中风，下利呕逆，表解者，乃可攻之。其人〈执水〉〈执水〉汗出，发作有时，头痛，心下痞鞭满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也。十枣汤主之。方十六。芫花熬 甘遂 大戟
上三味等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服。若下少，病不除者，明日更服，加半钱，得快下利后，糜粥自养。
太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭。无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤瞤者，难治；今色微黄，手足温者，易愈。
心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。方十七。大黄二两 黄连一两
上二味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。臣亿等看详：大黄黄连泻心汤，诸本皆二味，又后附子泻心汤，用大黄、黄连、黄芩、附子，恐是前方中亦有黄芩，后但加附子也，故后云附子泻心汤。本云加附子也。

[当归芍药散 下载链接1](#)

书评

[当归芍药散_下载链接1](#)